



Posterolateral vs. Direct Lateral Approach of Hemiarthroplasty after Femoral Neck Fracture

Doel

Vergelijken van posterolaterale en direct laterale benadering bij kophalsprothese na heupfracturen

Inclusie criteria

- ✓ Patiënt \geq 18 jaar
- ✓ Acute heupfractuur $<$ 7 dagen oud
- ✓ Kophalsprothese als aanbevolen behandeling volgens NL richtlijn
- ✓ Begrip van de Nederlandse taal

Exclusie criteria

- × Multitrauma patiënten (ISS \geq 16)
- × Secundaire chirurgie na falen osteosynthese materiaal / prothese van dezelfde fractuur
- × Pathologische fractuur of bekend gemetastaseerde ziekte



STAPPENPLAN

1

Patiënt met mediale collum fractuur waarvoor KHP
✓ **Voldoet aan de inclusie criteria**

2

Patiënt informeren

- Geef korte uitleg over de studie
- Geef Patiënt Informatie Brief

3

Includeren en Randomiseren

- 1) Onderteken Informed Consent in 2-voud
- 2) Includeren / Randomisatie:
 - Ga naar **www.apollotrial.nl**
 - Klik op “nu includeren”
 - Log in met APOLLO account van uw ziekenhuis (zie mail + poster)
 - Maak nieuw patiëntrecord aan en volg de stappen
- 3) **Mail record nummer, naam, geboortedatum en adres van de patiënt naar info@apollotrial.nl**

Of neem contact op met Ariena Rasker (OLVG)

Tel: 06 31953197

E-mail: info@apollotrial.nl

www.apollotrial.nl